

超・高粘度が乾きに効く

10mL


新ロートドライエイドEX[®]

潤いを保持する涙の3層構造

涙は、右の図のように油層・水層・ムチン層の3層で形成されています。

油層は涙の蒸発を防ぎ、
水層は酸素や栄養を多く含み、
ムチン層は涙を目の表面にとどめる役割を持っています。

それぞれの涙液層が役割を果たすことで、
目の表面に潤いを保つことができます。




目の乾き・疲れに



(イメージ図)

涙が不足すると…

涙液3層のバランスが崩れると、
涙の不足部分(ドライスポット)ができます。
これにより、角膜表面が露出するため、
目は乾き、負担を受けやすくなります。
その結果、疲れ、刺激感(痛み、まぶしさ)、
目が重い、目やにが出るなどの様々な
不快症状を引き起こしてしまいます。



「新ロートドライエイドEX」は、

涙液3層のバランスを整えることに着目した超・高粘度目薬。

とろっとした薬液が涙の膜を作るよう潤いをとどめ、目の乾きに優れた効果を発揮します。

製品特長



- 超・高粘度 (*約60倍) で潤いを保持 ★IV・ロートとの比較
- 角膜保護成分最大濃度配合: コンドロイチン硫酸エステルナトリウム配合
*一般用眼科用薬製造承認基準の最大濃度配合
- 涙液3層にアプローチした処方設計
- 涙のようにやわらかく広がるさし心地
 - ▶ ゴマ油 (製剤の安定剤)、
 - ▶ ヒアルロン酸ナトリウム (製剤の粘稠剤)、
 - ▶ ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール (溶解補助剤) 配合
- 防腐剤無添加 *防腐剤 (ベンザルコニウム塩化物、パラベン) 無配合



18世紀に、日本の医学の振興を目指して翻訳された"解体新書"。その開拓の思想のもとに、
ロートは現代人の目の疾患をあらゆる方向から見つめ直しています。現在までに培ってきた
ノウハウと最新技術で酷使される目に応えたい、その想いを「解眼新書」の文字に託しました。

解眼新書ホームページ <http://www.rclub2.rohto.co.jp/kaigan/>

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる
フリーイングルノズル[®]



簡単にアイケアできて、とっても便利です。



キャップの開け方
キャップを手前にひねってください。



キャップの閉め方
カチッと音がするまで押し下げてください。

*容器のわきを持ち、キャップを上にして開けてください。容器の中心を押さえて開封すると、薬液が飛び出しがあります。

使用上の注意

相談すること



1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
 ・ はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
 ・ 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. この場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回1~2滴、1日3~4回点眼してください。

用法・用量に関する注意

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。

〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕

また、混濁したものは使用しないでください。

(3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

(4) 点眼用にのみ使用してください。



成 分

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(角膜保護成分) 0.5% 塩化カリウム 0.02%

ヒドロキシエチルセルロース(HEC) 0.6% 塩化ナトリウム 0.44%

添加物として、ヒアルロン酸Na、ゴマ油、ホウ酸、ホウ砂、l-メントール、ベルガモット油、ペパermintオイル、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ポリソルベート80、塩化亜鉛、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4) 他の人と共用しないでください。

(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

(6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用ください。

(7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



※潤いを持続させるため、薬液に粘性をもたせております。そのため、点眼後、しばらく視野がぼやけることがありますのでご注意ください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1

401354301